

TIBBIYOTDA QO'LLANILISHIGA DOIR YO'RIQNOMA AMOKSIKLAV® 2X

Preparatning savdo nomi : Amoksislav® 2X

Ta'sir etuvchi modda (HPN): amoksitsillin, klavulon kislotasi

Dori shakli: plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar

Tarkibi:

faol moddalar: amoksitsillin 875 mg (amoksitsillin trigidratiga mos keluvchi), klavulon kislotasi 125 mg (kaliy klavulanatiga mos keluvchi);

yordamchi moddalar: suvsiz kolloid kremniy dioksidi, magniy stearati, talk, povidon, mikrokristall selluloza, krospovidon;

qobiq'i: trietilsitrat, gipromelloza, talk, etilsellyuloza suvli dispersiyasi, titan dioksidi.

Ta'rifi:

Oqdan och-sariq ranggacha plyonka qobiq bilan qoplangan, oval shaklli, 10.5 mm x 22.5 mm o'lchamdagi, ikkala tomonida riskasi bo'lgan tabletkalar.

Farmakoterapevtik guruhi: tizimli qo'llash uchun mikroblarga qarshi preparatlar. Tizimli qo'llash uchun antibakterial preparatlar. Penitsillinlar majmuasi, shu jumladan beta-laktamazalar ingibitorlari bilan majmualari. Amoksitsillin fermentlar ingibitorlari bilan majmuada.

ATX kodi: J01CR02

Farmakologik xususiyatlari

Farmakodinamikasi

Amoksitsillin bakteriyaning xujayra devorining integral komponenti — peptidoglikan biosintezi jarayonida bitta yoki undan ko'proq fermentlarni (ko'pincha penitsillin bog'lovchi oqsillar deb nomlanuvchi) ingibitsiya qiluvchi yarimsintetik penitsillin (beta-laktam antibiotik) bo'lib hisoblanadi. Peptidoglikan sintezini ingibitsiya qilinishi xujayra devorining mustahkamligini yo'qolishiga olib keladi, bu xujayra lizisi va nobud bo'lishi bilan kechadi.

Amoksitsillin rezistent bakteriyalar tomonidan sintezlanadigan beta-laktamazalar ta'siri ostida parchalanadi, shuning uchun ushbu fermentlarni ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlarga nisbatan faol emas.

Klavulon kislotasi tuzilishi jihatidan penitsillinlarga o'xshash beta-laktam bo'lib hisoblanadi. U ayrim beta-laktamazalarni susaytiradi va amoksitsillinni faolsizlanishini oldini oladi. Klavulon kislotasining o'zi klinik foydali antibakterial ta'sir ko'rsatmaydi.

Minimal bostiruvchi konsentratsiyani tutib turish vaqti ($T > MBK$) amoksitsillinning asosiy determinant samaradorligi bo'lib tan olingan.

Alohida turlarning rezistentligini tarqalganligi geografik va vaqtga bog'liqlik bilan xarakterlanadi, shuning uchun antibiotikorezistentlik bo'yicha mahalliy ma'lumotni olgan afzal, ayniqsa og'ir darajadagi infeksiya holatida. Antibiotikorezistentlikning mahalliy ko'rsatkichlari preparatni qo'llashni kamida infeksiyalarning ayrim tiplarida maqsadga muvofiqligini gumon ostiga qo'ygan holatlarda yordam uchun tegishli mutaxassislariga murojaat etish kerak.

Odatda sezgir turlar

Grammusbat aeroblar: *Enterococcus faecalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Staphylococcus aureus* (metitsillinga sezgir shtammlar)*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*¹, *Streptococcus pyogenes* va boshqa beta-gemolitik streptokokklar, viridans guruhi streptokokklari

Grammanfiy aeroblar: *Capnocytophaga spp.*, *Eikenella corrodens*, *Haemophilus influenzae*², *Moraxella catarrhalis*, *Pasteurella multocida*

Anaeroblar: *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium nucleatum*, *Prevotella spp.*

Orttirilgan rezistentlik rivojlanishi mumkin bo'lgan turlar

Grammusbat aeroblar: *Enterococcus faecium*[#]

Grammanfiy aeroblar: *Escherichia coli*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*

Tabiiy rezistentlikka ega turlar

Grammanfiy aeroblar: *Acinetobacter spp.*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter spp.*, *Legionella pneumophila*, *Morganella morganii*, *Providencia spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Serratia spp.*, *Stenotrophomonas maltophilia*

Boshqa mikroorganizmlar: *Chlamydophila pneumoniae*, *Chlamydophila psittaci*, *Coxiella burnetti*, *Mycoplasma pneumoniae*

[#] Orttirilgan rezistentlik mexanizmi bo'lmaganida tabiiy oraliq sezuvchanlik.

* Barcha metitsillinga rezistent stafilokokklar amoksitsillin / klavulon kislotasiga rezistent.

¹ Penitsillinga rezistent *Streptococcus pneumoniae* chaqirgan infeksiyalarni davolash uchun ushbu preparatni qo'llash mumkin.

² Yel ning ayrim holatlarida sezuvchanligi pasaygan shtammlar aniqlangan (aniqlanish tez-tezligi – 10% dan ko'proq holatlarda).

Farmakokinetikasi

Amoksitsillin va klavulon kislotasi rN ning fiziologik darajasida suvli eritmada to'liq dissotsiatsiyaga uchraydi. Preparatning ikkala komponentlari ichga qabul qilingandan keyin tez va yaxshi so'riladi, bunda ularning biokiraolishligi taxminan 70% ga erishadi. Ikkala komponentlarning plazmadagi konsentratsiyasi profili o'xshash va har bir modda uchun cho'qqi konsentratsiyasiga erishish vaqti (T_{max}) taxminan bir soatni tashkil qiladi.

Sog'lom ko'ngillilar tomonidan 875 mg/125 mg tabletkalar sutkada ikki marta och qoringa qabul qilinganda zardobdagi maksimal konsentratsiyalari amoksitsillin uchun $11,64 \pm 2,78$ mkg/ml va klavulon kislotasi uchun $2,18 \pm 0,99$ mkg/ml, maksimal konsentratsiyasi erishish vaqti amoksitsillin uchun — 1,5 (diapazon 1,0–2,5) soat va klavulon kislotasi uchun 1,25 (diapazon 1,0–2,0) soat, $AUC_{(0-24 \text{ soat})}$ — amoksitsillin uchun $53,52 \pm 12,31$ mkg·soat/ml va klavulon kislotasi uchun $10,16 \pm 3,04$ mkg·soat/ml, yarim chiqarilish davri ($T_{1/2}$) — amoksitsillin uchun $1,19 \pm 0,21$ soat, klavulon kislotasi uchun $0,96 \pm 0,12$ soatni tashkil qilgan.

Plazmada klavulon kislotasining umumiy miqdoridan taxminan 25% va amoksitsillinning umumiy miqdorining 18% oqsillar bilan bog'langan holatda bo'ladi. Vena ichiga yuborilgandan keyin amoksitsillin va klavulon kislotasi o't qopi, qorin parda to'qimalarida, teri, yog' to'qimasi, mushak to'qimasi, sinovial va peritoneal suyuqliklar, safro va yiringda aniqlanadi. Amoksitsillin faqatgina ahamiyatsiz miqdorda orqa miya suyuqligiga kiradi.

Amoksitsillin va klavulon kislotasi ko'krak sutida aniqlanadi (klavulon kislotasi — juda past miqdorda). Ikkala moddalar yo'ldosh orqali o'tadi.

Amoksitsillin asosan buyraklar orqali chiqariladi, ayni vaqtda klavulon kislotasi organizmdan ham buyrak, ham jigardan tashqari mexanizmlar orqali chiqariladi.

Yosh

Amoksitsillinning yarim chiqarilish davri uch oylikdan ikki yoshgacha bo'lgan bolalar, kattaroq yoshdagi bolalar va kattalarda o'xshash. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda (shu jumladan chala tug'ilgan chaqaloqlarda) hayotining birinchi xaftasida buyrak orqali chiqarish yo'lini yetilmaganligi tufayli, preparatni sutkada ikki martadan ko'proq qo'llash mumkin emas. Keksa patsiyentlarda buyrak funksiyasini pasayishi ehtimoli yuqoriligi tufayli, ularda dozani ehtiyotkorlik bilan tanlash kerak; buyrak funksiyasini nazorat qilish maqsadga muvofiq.

Buyrak funksiyasini buzilishi

Amoksitsillin / klavulon kislotasining umumiy klirensi buyrak funksiyasini pasayishiga proporsional ravishda pasayadi. Klirensni pasayishi klavulon kislotasiga nisbatan amoksitsillin uchun yaqqolroq. Buyrak funksiyasini buzilishida doza klavulon kislotasining adekvat darajalarini tutib turganda amoksitsillinni haddan tashqari to'planishidan saqlanuvchi darajada tanlanadi ("Qo'llash usuli va dozalari" bo'limiga qarang).

Jigar funksiyasini buzilishi

Ehtiyotkorlik bilan qo'llanadi, jigar funksiyasi muntazam nazorat qilinadi.

Qo'llanilishi

- o'tkir bakterial sinusit;
- o'tkir o'rta otit;
- surunkali bronxitni zo'rayishi;
- kasalxonadan tashqari pnevmoniya;
- sistit;
- piyelonefrit;
- teri va yumshoq to'qimalar infeksiyalari (xususan teri osti kletchatkasini yallig'lanishi (flegmona), hayvonlar tishlashidan keyingi yaralar, parodontal abscess, yuz-jag' sohasi flegmonasi);
- suyaklar va bo'g'imlar infeksiyalari (xususan osteomiyelit)da qo'llanadi.

Qo'llash usuli va dozalari

Doza amoksitsillin va klavulon kislotasining miqdorini aks ettiradi.

Aniq infeksiyalarni davolash uchun dozani tanlaganda quyidagi omillar e'tiborga olinadi:

- qo'zg'atuvchining antibiotikka sezuvchanligi;
- infeksiyaning og'irlik darajasi va joylashishi;
- quyida ko'rsatilganidek patsiyentning yoshi, tana vazni va buyrak funksiyasi.

Ushbu preparatni quyida tavsiya etilgan dozalarda sutkada ikki marta qabul qilganda kattalar va tana vazni 40 kg va undan yuqori bo'lgan bolalar 1750 mg amoksitsillin va 250 mg klavulon kislotasiga, sutkada uch marta qabul qilganda esa - 2625 mg amoksitsillin va 375 mg klavulon kislotasiga teng umumiy sutkalik dozani qabul qilishadi. Ushbu preparatni quyida tavsiya etilgan dozalarda qabul qilganda tana vazni 40 kg dan kam bo'lgan bolalar uchun maksimal sutkalik doza 1000–2800 mg amoksitsillin va 143–400 mg klavulon kislotasini tashkil qiladi. Amoksitsillinning yuqoriroq sutkalik dozasi qo'llash zarurati bo'lganida klavulon kislotasining haddan tashqari yuqori sutkalik dozasi qabul qilishdan saqlanish uchun preparatning boshqa chiqarilish shaklini qo'llash tavsiya etiladi.

Kattalar va tana vazni 40 kg va undan yuqori bo'lgan bolalar

Bitta tabletka sutkada ikki marta buyuriladi.

Tana vazni 40 kg dan kam bo'lgan bolalar

Ushbu dori shakli tana vazni 40 kg dan kam bo'lgan bolalar uchun mo'ljallanmagan, ularga ichga qabul qilish uchun suspenziya ko'rinishidagi Amoksiklav® preparati buyuriladi.

Keksa yoshdagi patsiyentlar

Dozaga tuzatish kiritish talab etilmaydi.

Buyrak funksiyasini buzilishi bo'lgan patsiyentlar

Dozaga tuzatish kiritish amoksitsillinning maksimal tavsiya etilgan darajalariga qarab amalga oshiriladi. Kreatinin klirensi (CrCl) 0,5 ml/sekund (minutiga 30 ml)dan yuqori bo'lgan patsiyentlarga preparatni buyurganda dozaga tuzatish kiritish talab etilmaydi

Kreatinin darajasi ko'rsatkichi minutiga 30 ml dan kam bo'lgan patsiyentlarda 875 mg / 125 mg dozada amoksitsillin va klavulon kislotasini qo'llash tavsiya etilmaydi, chunki dozalash bo'yicha biron-bir tavsiyalar mavjud emas.

Jigar funksiyasini buzilishi bo'lgan patsiyentlar

Ehtiyotkorlik bilan qo'llanadi. Jigar funksiyasini muntazam nazorat qilish zarur.

Qo'llash usuli

Me'da-ichak yo'llari tomonidan buzilishlarni kamaytirish va amoksitsillin / klavulon kislotasini so'rilishini oshirish uchun tabletkalarni ovqat qabul qilishdan oldin peroral qabul qilinadi.

Navbatdagi doza o'tkazib yuborilganda uni yodga tushishi bilanoq iloji boricha tezroq qabul qiling. Keyingi dozani qabul qilishdan oldin ushbu dozadan keyin kamida 4 soat o'tishi kerak. O'tkazib yuborilgan dozani o'rnini to'ldirish uchun dozani ikki marta qabul qilmang.

Davolash davomiyligi

Davolash davomiyligi patsiyentning reaksiyasiga bog'liq. Ayrim infeksiyalar (masalan osteomiyelit) davomli davolashni talab etadi. Davolashning maksimal vaqti 14 kundan oshmasligi kerak.

Nojo'ya ta'sirlari

Noxush reaksiyalarning rivojlanish tez-tezligini tasniflash uchun quyidagi mezonlardan foydalanilgan: juda tez-tez ($\geq 1/10$), tez-tez ($\geq 1/100$ dan $< 1/10$ gacha), tez-tez emas ($\geq 1/1000$ dan $< 1/100$ gacha), kam xollarda ($\geq 1/10000$ dan $< 1/1000$ gacha), juda kam xollarda ($< 1/10000$), tez-tezligi noma'lum (mavjud ma'lumotlardan kelib chiqib baholab bo'lmaydi).

Eng ko'p uchraydigan noxush reaksiyalar bo'lib diareya, ko'ngil aynishi va qusish hisoblanadi.

Infeksion va parazitlar kasalliklar

Tez-tez: teri va shilliq qavatlar kandidozi.

Tez-tez emas: sezgir bo'lmagan organizmlarni o'sishi, eozinofiliya va tizimli simptomlar bilan kechuvchi dori vositasiga reaksiya (DRESS-sindrom), aseptik meningit.

Oon va limfatik tizim tomonidan buzilishlar

Kam xollarda: qaytuvchan leykopeniya (shu jumladan neytropeniya), trombositopeniya.

Tez-tezligi noma'lum: qaytuvchan agranulotsitoz, gemolitik anemiya, qon ketishi vaqtini va protrombin vaqtini uzayishi, Kounis sindromi (allergik koronar sindrom).

Immun tizimi tomonidan buzilishlar

Tez-tezligi noma'lum: angionevrotik shish, anafilaksiya, zardobsimon sindrom, allergik vaskulit.

Nerv tizimi tomonidan buzilishlar

Kam xollarda: bosh aylanishi, bosh og'rig'i, aseptik meningit.

Tez-tezligi noma'lum: qaytuvchan giperfaollik, tirishishlar.

Me'da-ichak yo'llari tomonidan buzilishlar

Tez-tez: ko'ngil aynishi (ko'pincha yuqori dozalarni qabul qilish bilan bog'liq; agar preparatni ovqatlanishni boshida qabul qilinsa, me'da-ichak yo'llari tomonidan reaksiyalarning yaqqoligini kamaytirish mumkin), qusish, diareya.

Tez-tez emas: ovqat hazm qilishni buzilishi.

Tez-tezligi noma'lum: antibiotik-assotsiatsiyalangan kolit (shu jumladan soxtamembranoz va gemorragik, "Maxsus ko'rsatmalar" bo'limiga qarang), "qora tukli" til, dori preparati induksiya qilgan enterokolit sindromi, o'tkir pankreatit, tish ranglarini yuzaki o'zgarishi. Juda kam xollarda bolalarda tish rangini yuzaki o'zgarishlari haqida xabar berilgan. Og'iz bo'shlig'ini tegishli gigiyenasi tishlarni bo'yalishini oldini olishga yordam berishi mumkin, chunki u odatda tish shetkasi yordamida bartaraf etiladi.

Jigar va o't chiqarish yo'llari tomonidan buzilishlar

Tez-tez emas: AST va (yoki) ALT darajasini oshishi (beta-laktam antibiotiklari bilan davolangan patsiyentlarda o'rtacha oshish kuzatilgan, ammo ushbu kuzatuvlarning ahamiyati noma'lum).

Tez-tezligi noma'lum: gepatit, xolestatik sariqlik (ushbu noxush ko'rinishlar boshqa penitsillinlar va sefalosporinlarni qo'llash fonida kuzatilgan ("Maxsus ko'rsatmalar" bo'limiga qarang).

Teri va teri osti to'qimalari tomonidan buzilishlar

Har qanday teri allergik reaksiyalari rivojlanganda davolash to'xtatiladi ("Maxsus ko'rsatmalar" bo'limiga qarang).

Tez-tez emas: teri toshmasi, qichishish, eshakemi, chiziqli IgA ga bog'liq dermatoz.

Kam xollarda: ko'p shaklli eritema.

Tez-tezligi noma'lum: Stivens-Djonson sindromi, toksik epidermal nekroliz, bullyoz eksfoliativ dermatit va o'tkir tarqalgan ekzantematoz pustulyoz ("Maxsus ko'rsatmalar" bo'limiga qarang), eozinofiliya va tizimli simptomlar bilan kechuvchi dori vositasiga reaksiya (DRESS-sindrom).

Buyrak va siydik chiqarish yo'llari tomonidan buzilishlar

Tez-tezligi noma'lum: interstitsial nefrit, kristalluriya.

Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar

- preparatning ta'sir etuvchi moddalar yoki yordamchi moddalariga, shuningdek biron-bir penitsillinlarga yuqori sezuvchanlik;

- anamnezida boshqa beta-laktam preparatlariga (masalan sefalosporinlar, karbapenemlar yoki monobaktamlarga) o'ta yuqori sezuvchanlikning og'ir darajadagi reaksiyalari;
- anamnezida xolestatik sariqlik yoki jigar yetishmovchiligining boshqa holatlarida qo'llash mumkin emas (amoksitsillin / klavulon kislotasini qo'llash sababli).

Dorilarning o'zaro ta'siri

Peroral antikoagulyanti

Peroral antikoagulyantlar va penitsillin guruhiga mansub antibiotiklar o'zaro ta'sir haqida xabar berilmasdan keng qo'llanadi. Ammo adabiyotdagi manbalarda atsenokumarol yoki varfarinni amoksitsillin bilan birga qabul qilgan patsiyentlarda halqaro normallashtgan nisbatni oshishi kuzatilgan. Agar preparatlarni bir vaqtda qo'llash zarur bo'lsa, amoksitsillinni buyurganda va bekor qilganda protrombin vaqti yoki halqaro normallashtgan nisbatni sinchkovlik bilan nazorat qilish kerak. Bundan tashqari peroral antikoagulyantlarning dozasi o'zgartirish talab etilishi mumkin.

Metotreksat

Penitsillin guruhiga mansub preparatlar metotreksatni chiqarilishini kamaytirishi mumkin, bu toksiklikni potensial oshishini chaqiradi.

Probenetsid

Probenetsidni bir vaqtda qo'llash tavsiya etilmaydi. Probenetsid amoksitsillinning buyrak kanalchalari sekretsiyasini kamaytiradi. Amoksiklav® preparati bilan birga qo'llash qonda amoksitsillinning darajasini oshishiga olib kelishi mumkin, ammo klavulon kislotasining emas.

Mikofenolat mofetili

Mikofenolat mofetilini qabul qilayotgan patsiyentlarda Amoksiklav® preparati bilan birga qo'llaganda, mikofenol kislotasining faol metabolitining konsentratsiyasi boshlang'ich dozasi taxminan 50% ga pasayadi. Boshlang'ich doza konsentratsiyasining darajasini o'zgarishi mikofenol kislotasining yig'indi dozasi o'zgarishiga mos kelmasligi mumkin.

Maxsus ko'rsatmalar

Amoksitsillin / klavulon kislotasi bilan davolashni boshlashdan oldin patsiyentda penitsillinlar, sefalosporinlar yoki boshqa beta-laktam moddalarga o'ta yuqori sezuvchanlik reaksiyalari mavjudligini sinchkovlik bilan o'rganish kerak.

Penitsillin bilan davolangan patsiyentlarda o'ta yuqori sezuvchanlikning jiddiy va ayrim holatlarda o'limga olib keluvchi (anafilaktik) reaksiyalari qayd etilgan. O'ta yuqori sezuvchanlik reaksiyalari shuningdek miokard infarktiga olib keluvchi jiddiy allergik reaksiya Kounis sindromigacha avj olishi mumkin. Ushbu reaksiyalar ko'pincha anamnezida penitsillinlarga o'ta yuqori sezuvchanlik reaksiyalari va atopiyasi bo'lgan odamlarda uchraydi. Amoksitsillin / klavulon kislotasiga allergik reaksiya rivojlanganda ushbu preparat bilan davolashni to'xtatish va boshqa muqobil davolashga o'tish kerak.

Agar infeksiya amoksitsillinga chidamli bo'lgan holatlarda amoksitsillinning o'rniga amoksitsillin / klavulon kislotasini qo'llash ehtimolini ko'rib chiqish kerak.

Qo'zg'atuvchining beta-laktam antibiotiklariga yuqori chidamliligida Amoksiklav® preparatini qo'llash mumkin emas. Penitsillinga chidamli *S. pneumoniae* ni davolash uchun preparatni qo'llash tavsiya etilmaydi.

Buyrak funksiyasini buzilishi bo'lgan va preparatning yuqori dozalarini qabul qilayotgan patsiyentlarda tirishishlar rivojlanishi mumkin.

Infeksion mononukleozda amoksitsillin / klavulon kislotasini buyurish mumkin emas, chunki qizamiqsimon toshma paydo bo'lishi mumkin (amoksitsillinga).

Amoksitsillin bilan davolash vaqtida allopurinolni bir vaqtda qo'llash teri allergik reaksiyalari rivojlanishi ehtimolini oshirishi mumkin. Hozirgi vaqtda allopurinol va Amoksiklav® preparatini bir vaqtda qo'llash haqidagi ma'lumotlar mavjud emas.

Preparatni uzoq vaqt qo'llash sezgir bo'lmagan mikroorganizmlarni haddan tashqari o'sishini chaqirishi mumkin.

Davolashni boshida pustulyoz toshma va isitma bilan kechuvchi tarqalgan eritemani paydo

bo'lishi o'tkir tarqalgan ekzantematoz pustulyoz simptomi bo'lishi mumkin. Ushbu reaksiya rivojlanganda Amoksiklav® preparatini qo'llashni to'xtatish va kelajakda amoksitsillinni umuman qo'llamaslik talab etiladi.

Jigar yetishmovchiligi bo'lgan patsiyentlarda preparatni ehtiyotkorlik bilan buyurish kerak.

Jigar funksiyasini buzilishini paydo bo'lishi holatlari asosan erkaklar va keksa patsiyentlarda qayd etilgan, preparatni uzoq vaqt davomida qabul qilgan bolalarda kam holatlarda qayd etilgan. Belgilar va simptomlar odatda davolash vaqtida yoki davolash boshlangandan keyin darhol rivojlanadi, ammo ayrim holatlarda faqatgina davolash to'xtatilgandan keyin bir necha hafta o'tgach namoyon bo'lishi mumkin. Ushbu simptomlar odatda qaytuvchan. Jigar tomonidan asoratlar og'ir shaklda bo'lishi va juda kam holatlarda o'limga olib kelishi mumkin. Ular deyarli har doim jiddiy yondosh kasalliklari bo'lgan patsiyentlarda yoki jigarga ta'sir ko'rsatadigan boshqa preparatlarni qabul qilayotgan patsiyentlarda rivojlanadi.

Antibiotik-assotsiatsiyalangan kolit rivojlanishi har qanday antibakterial preparatlar, shu jumladan amoksitsillin uchun xarakterli va yaqqollik darajasi bo'yicha o'rtachadan hayotga xavf soluvchi darajagacha o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har qanday antibiotiklarni qo'llash vaqtida yoki qo'llagandan keyin diareyasi bo'lgan patsiyentlarga buyurganda ushbu diagnozni e'tiborga olish kerak. Antibiotik-assotsiatsiyalangan kolit yuzaga kelganida Amoksiklav® preparatini qo'llashni darhol to'xtatish kerak. Shifokor bilan maslahatlashgandan keyin tegishli davolash buyurilishi kerak. Bunday holatlarda ichak peristaltikasini susaytiruvchi preparatlarni qo'llash mumkin emas.

Uzoq vaqt davolaganda tizimlar va a'zolar, shu jumladan buyrak, jigar va qon yaratish funksiyalarini baholash kerak.

Qon ivishining kutilgan darajasini tutib turish uchun peroral antikoagulyantlarning dozasiga tuzatish kiritish kerak.

Buyrak funksiyasini buzilishi bo'lgan patsiyentlarda, buzilishning yaqqollik darajasiga qarab dozaga tuzatish kiritish talab etiladi.

Diurezi susaygan patsiyentlarda juda kam xollarda, asosan parenteral davolash vaqtida kristalluriya (shu jumladan o'tkir buyrak yetishmovchiligi) kuzatilgan. Davolash vaqtida kristalluriya rivojlanishi ehtimolidan saqlanish uchun ko'p miqdorda suyuqlik qabul qilish tavsiya etiladi. Olingan ma'lumotlarga muvofiq amoksitsillin qovuq kateterlaridan cho'kadi (asosan yuqori dozalarni vena ichiga yuborganda), bunday holatlarda kateterning o'tkazuvchanligini muntazam tekshirish kerak.

Amoksitsillinni qo'llash bilan davolash vaqtida siydikda glyukozani mavjudligiga tahlillar o'tkazilganda glyukozooksidazaning fermentativ usullarini qo'llash kerak, chunki nofermentativ usullarni qo'llaganda soxtamusbat natijalar kuzatilishi mumkin.

Amoksiklav® preparatining tarkibida klavulon kislotasini mavjudligi immunoglobulin G va albuminni eritrotsitlar membranalariga nospetsifik bog'lanishiga va Kumbs sinamasining soxtamusbat natijalariga olib kelishi mumkin.

Preparat qabul qilgan patsiyentlarda *Aspergillus* ga immunoferment tahlil (IFT)ning soxtamusbat natijalari holatlari kuzatilgan. *Aspergillus* ga IFT doirasida noaspergillyoz polisaxaridlar va polifuranozlar bilan kesishgan reaksiyalar kuzatilgan. Amoksiklav® preparatini qabul qilayotgan patsiyentlarda tahlillarning musbat natijalarini ehtiyotkorlik bilan interpretatsiya qilinishi va boshqa diagnostik usullar yordamida tasdiqlanishi kerak.

Dori induksiya qilgan enterokolit sindromi (DIES) ko'pincha amoksitsillin / klavulon qabul qilgan bolalarda kuzatilgan. DIES – bu allergik teri yoki respirator simptomlar bo'lmaganida davomli qusish asosiy simptomi bo'lgan allergik reaksiyadir (preparatni qabul qilgandan keyin 1-4 soat o'tgach). Qo'shimcha simptomlar qorinda og'riq, diareya, gipotenziya yoki neytrofiliya bilan kechuvchi leykotsitozni o'z ichiga olishi mumkin. Og'ir darajadagi holatlar shokkacha avj olishni o'z ichiga oladi.

Homiladorlik va laktatsiya davrida qo'llanishi

Homiladorlik

Homiladorlik, embrion / homilani rivojlanishi, tugʻruq yoki postnatal rivojlanish yuzasidan bevosita yoki bilvosita zararli taʼsiri haqidagi maʼlumotlar mavjud emas.

Odamda homiladorlik vaqtida Amoksiklav® preparatini qoʻllash boʻyicha cheklangan miqdordagi maʼlumotlar mavjud, ularga muvofiq rivojlanishning tugʻma nuqsonlari xavfini oshishi aniqlanmagan. Homila atrofidagi qobiqni muddatidan oldin yorilishi kuzatilgan ayollarda amoksitsillin / klavulon kislotasi bilan profilaktik davolash va yangi tugʻilgan chaqaloqda nekrotik enterokolit xavfini oshishi oʻrtasida sabab-oqibat bogʻliqligi qayd etilgan. Homiladorlik vaqtida Amoksiklav® preparatini qoʻllash tavsiya etilmaydi, faqatgina juda zarur holatlarda shifokor koʻrsatmasi boʻyicha qoʻllash mumkin.

Emizish davri

Ikkala faol moddalar koʻkrak suti bilan ajraladi (klavulon kislotasining emizishga taʼsiri haqidagi maʼlumotlar mavjud emas). Shuning uchun emizish davrida ich ketishi va shilliq qavatlarning zamburugʻli kasalliklari paydo boʻlishi mumkin, bunday holatlarda emizishni toʻxtatish kerak. Emizish davrida Amoksiklav® preparatini qoʻllashga faqatgina davolovchi shifokor tomonidan foyda/xavfni baholagandan keyin qoʻllashga ruxsat etiladi.

Avtomobil va murakkab mexanizmlarni boshqarish qobiliyatiga taʼsiri

Avtomobil va texnikani boshqarish imkoniyatiga taʼsir qiluvchi samaralarni aniqlash boʻyicha tadqiqotlar oʻtkazilmagan. Shunga qaramasdan, Amoksiklav® preparati allergik reaksiyalar, bosh aylanishi, tirishishlar kabi nojoʻya taʼsirlar chaqirishi mumkin, ular avtomobil va harakatlanuvchi mexanizmlarni boshqarish qobiliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Dozani oshirib yuborilishi

Simptomlari: meʼda-ichak tomonidan simptomlar va suv-elektrolit muvozanatini buzilishlari kuzatilishi mumkin. Amoksitsillin kristalluriyasi ayrim holatlarda buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Buyrak funksiyasini buzilishi boʻlgan patsiyentlarda yoki preparatning yuqori dozalarini qabul qilayotgan patsiyentlarda tirishishlar kuzatilishi mumkin.

Davolash: suv-elektrolit muvozanatini eʼtiborga olib simptomatik davolash. Amoksitsillin / klavulon kislotasi gemodializ yordamida organizmdan chiqarilishi mumkin.

Chiqarilish shakli

5 yoki 7 tabletkalan ichki tomonidan PVX qavatli ikki qavatli alyumin folgali blisterda. 2 blisterdan tibbiyotda qoʻllanilishiga doir yoʻriqnomasi bilan karton qutida.

Saqlash sharoiti

Quruq joyda, 30°C dan yuqori boʻlmagan haroratda, original oʻramida saqlansin. Bolalar ololmaydigan joyda saqlansin.

Yaroqlilik muddati

2 yil.

Oʻramida koʻrsatilgan yaroqlilik muddati oʻtgach qoʻllanilmasin.

Dorixonalardan berish tartibi

Retsept boʻyicha.

Roʻyxatdan oʻtkazilganlik guvohnomasining egasi

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova Ulica 57, Ljubljana, 1526, Sloveniya.

Ishlab chiqaruvchi

Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Avstriya.

O'zbekiston Respublikasi hududida dori vositalarining sifati bo'yicha e'tiroz (taklif)larni qabul qiluvchi tashkilot nomi va manzili

«Sandoz Pharmaceuticals d. d.» vakolatxonasi

100015, Toshkent sh., Oybek ko'ch., 24 uy.

Telefon: +99878-147-03-35

El. pochta manzili: adverse.event.uzbekistan@sandoz.com

O'zbekiston Respublikasi hududida raqamli markirovkalash bo'yicha e'tiroz (taklif)larni qabul qiluvchi tashkilot nomi va manzili

«Sandoz Pharmaceuticals d. d.» vakolatxonasi

100015, Toshkent sh., Oybek ko'ch., 24 uy.

Telefon: +99878-147-03-35

El. pochta manzili: info.uz@sandoz.com